

تغذیه زعفران

✓ **کوددهی قبل از اولین آبیاری :** 10 تا 20 تن کود گاوی پوسیده در هر هکتار در اواخر مهر تا 5 آبان همراه با دیسک بسیار سبک استفاده شده و سپس آبیاری اول (حداقل 15 تا 20 روز قبل از گلدهی) به همراه ترکیبات ذیل انجام شود. بعد از گاورو شدن زمین عملیات سله شکنی با تیلر به عمق 5 تا 10 سانتی متر انجام شود.

➤ نکته: عملیات فوق الذکر در خصوص مناطق کوهستانی حدود یک ماه زودتر انجام می گیرد.

✓ همراه آب اول (قبل از گلدهی):

1- اوره 50 کیلو گرم در هر هکتار

2- NPK (10-52-10) به میزان 10 کیلو گرم در هکتار

3- اسید هیومیک 4 لیتر در هکتار

4- کود آهن سکوسترین 4 کیلو گرم در هکتار

✓ بعد از برداشت گل (همراه با دومین آبیاری پاییزه):

1- اوره 50 کیلو گرم در هر هکتار

2- سولو پتاس 25 کیلو گرم در هر هکتار

➤ نکته: در این مرحله بعد از گاورو شدن زمین عملیات سله شکنی و مبارزه مکانیکی با علفهای هرز انجام گیرد.

✓ همراه با سومین آبیاری (به فاصله یک ماه بعد از آبیاری قبلی):

1- کود NPK (10-52-10) به میزان 10 کیلو گرم در هر هکتار

2- هیومیک اسید 4 لیتر در هر هکتار

توجه :

➤ **محلولپاشی در بهمن ماه دو نوبت اوایل و آخر بهمن با کودهای ریزمغذی به نسبت 5 در هزار انجام گردد.**

➤ **در صورت عدم بارندگی آبیاری چهارم به فاصله یک ماه بعد انجام گردد.**